



**Olimpiada Națională de Matematică**  
**Etapa Județeană și a Municipiului București, 19 martie 2016**  
**CLASA a VIII-a**

**Problema 1.** Arătați că într-o piramidă patrulateră regulată două fețe laterale opuse sunt perpendiculare dacă și numai dacă unghiul dintre două fețe laterale alăturate are măsura de  $120^\circ$ .

*Gazeta Matematică*

**Soluție .** Fie  $VABCD$  o piramidă patrulateră regulată cu baza  $ABCD$ . Notăm cu  $a$  lungimea laturii  $AB$ . Fețele  $VAD$  și  $VBC$  sunt perpendiculare dacă și numai dacă triunghiul  $VMN$  este dreptunghic isoscel cu laturile  $VM = VN = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ , unde  $M$  și  $N$  sunt mijloacele muchiilor  $AD$  respectiv  $BC$  ..... 2 puncte.

Dacă  $P$  este piciorul perpendicularei din  $A$  pe  $VB$  (același cu piciorul perpendicularei din  $C$  pe  $VB$ ), atunci obținem echivalent  $PC = PA = \frac{a\sqrt{6}}{3}$  (evaluând aria triunghiului  $VBC$  în două moduri) ..... 2 puncte

Aceasta este echivalent cu faptul că triunghiul isoscel  $ACP$  are măsura unghiului  $\angle APC$  de  $120^\circ$  (folosind eventual o funcție trigonometrică) ... 2 puncte

Unghiul plan al diedrului căutat este  $\angle APC$  ..... 1p

**Problema 2.** Pentru orice număr natural nenul  $n$  notăm cu  $x_n$  numărul numerelor naturale de  $n$  cifre, divizibile cu 4, formate cu cifrele 2, 0, 1 sau 6.

a) Să se calculeze  $x_1, x_2, x_3$  și  $x_4$ .

b) Să se găsească numărul natural  $n$  astfel încât

$$1 + \left\lfloor \frac{x_2}{x_1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x_3}{x_2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x_4}{x_3} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\rfloor = 2016,$$

unde  $[a]$  reprezintă partea întreagă a numărului real  $a$ .

**Soluție .** a)  $x_1 = 1$  (0 este divizibil cu 4),  $x_2 = 4$  (numerele 12, 16, 20 și 60 sunt divizibile cu 4),  $x_3 = 3 \cdot 5$ , (pentru că prima cifră nu poate fi 0 iar ultimele două pot fi 12, 16, 20, 60 și 00),  $x_4 = 3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$  (pentru că prima cifră nu poate fi 0, pentru a 2-a avem 4 posibilități iar ultimele două pot fi

12, 16, 20, 60 și 00) ..... 3 puncte.

b) Dacă  $n \geq 3$ , un număr  $A$  care verifică condițiile din enunț este de forma  $A = \overline{a_1 a_2 \dots a_{n-2} p q}$  unde prima cifră poate lua 3 valori, fiecare dintre cifrele  $a_2, a_3, \dots, a_{n-2}$  poate fi aleasă în 4 moduri iar ultimele două pot fi 12, 16, 20, 60 și 00.

Rezultă că  $x_n = 3 \cdot 4^{n-3} \cdot 5$  pentru orice  $n \geq 3$  ..... 2 puncte

Pentru orice  $n \geq 3$ ,  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = 4$ , de unde  $1 + \left\lfloor \frac{x_2}{x_1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x_3}{x_2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x_4}{x_3} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{x_{n+1}}{x_n} \right\rfloor = 1 + 4 + 3 + 4(n-2)$ ,  $4n = 2016$ ,  $n = 504$  ..... 2 puncte .

**Problema 3.** a) Demonstrați că pentru orice număr întreg  $k$ , ecuația  $x^3 - 24x + k = 0$  are cel mult o soluție întreagă.

b) Arătați că ecuația  $x^3 + 24x - 2016 = 0$  are exact o soluție întreagă.

**Soluție .** a) Presupunem prin absurd că există două numere întregi diferite  $m$  și  $n$  astfel încât  $m^3 - 24m + k = 0$  și  $n^3 - 24n + k = 0$ .

Prin scădere obținem  $(m - n)(m^2 + mn + n^2 - 24) = 0$  ..... 1 punct

$m^2 + mn + n^2 = 24$  ( $m$  și  $n$  sunt diferite) de unde  $(2m + n)^2 + 3n^2 = 96$   
1 punct

$n^2 \leq 32$ ,  $n^2 \in \{0, 1, 4, 9, 16, 25\}$  ..... 1 punct

$(2m + n)^2 \in \{96, 93, 84, 69, 48, 21\}$ , contradicție ..... 1 punct

b)  $x(x^2 + 24) = 2016$  de unde  $x$  poate fi doar natural nenul.  $x = 12$  verifică ecuația ..... 1 punct

Dacă prin absurd există  $x < y$  naturale care verifică ecuația atunci  $x^2 + 24 < y^2 + 24$  ..... 1 punct


$2016 = x(x^2 + 24) < x(y^2 + 24) = 2016$  contradicție ..... 1 punct

**Problema 4.** Fie  $ABCD A' B' C' D'$  un paralelipiped dreptunghic și  $M$  respectiv  $N$  picioarele perpendicularelor duse din  $A'$  și  $C'$  pe  $BD$ . Lungimile muchiilor  $AB$ ,  $BC$  și  $AA'$  sunt egale cu  $\sqrt{6}$ ,  $\sqrt{3}$  și respectiv  $\sqrt{2}$ .

a) Demonstrați că  $A'M \perp C'N$ .

b) Calculați măsura unghiului dintre planele  $(A'MC)$  și  $(ANC')$ .

**Soluție .**



a)  $AM \perp BD$ ,  $AM = \sqrt{2}$  deci triunghiul  $A'M$  este isoscel. Analog  
 triunghiul  $C'CN$  ..... 1 punct  
 Rezultă  $\angle A'MA = \angle C'NC = 45^\circ$ , deci unghiul dintre dreptele  $A'M$  și  
 $C'N$  este de  $90^\circ$  ..... 1 punct.

b) Fie  $CM \cap AD = \{M'\}$ ,  $AN \cap BC = \{N'\}$ ,  $P$  și  $Q$  mijloacele seg-  
 mentelor  $[N'C']$  respectiv  $[A'M']$ .  $BD = 3$ ,  $DM = MN = NB = 1$ ,  $DM' =$   
 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .  $M'$  și  $N'$  sunt mijloacele muchiilor  $[AD]$  respectiv  $[BC]$ . Intersecția  
 planelor  $(A'MC')$  și  $(ANC')$  este dreapta  $PQ$  ..... 2 puncte

Fie  $O$  și  $O'$  mijloacele segmentelor  $[BD]$  respectiv  $[PQ]$  și  $R \in AN$ ,  
 $S \in CM$  intersecțiile perpendicularei din  $O$  pe  $AN$  ( și pe  $CM$ ). Unghiul  
 planelor  $(A'MC')$  și  $(ANC')$  este  $\angle RO'S$  ..... 1 punct

$CM' = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ ,  $RS = \frac{\sqrt{6}}{3}$  (se exprimă aria lui  $AN'CM'$  în două moduri),  
 $OO' = \frac{\sqrt{2}}{2}$  rezultă că triunghiul  $RO'S$  este echilateral deci măsura unghiul  
 căutat este de  $60^\circ$  ..... 2 puncte.

*Timp de lucru 4 ore.*

*Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.*